CRITERE COMMUNAUTE
(basé sur l'abondance des adultes)

Echelle : 1 / 1 000 000 (48°N)
Projection de Mercator
Système géodésique WGS84
0 10 20 30 40 50 Km

CRITERE NOURRICERIE
(basé sur l'abondance des juvéniles)

Echelle : 1 / 1 000 000 (48°N)
Projection de Mercator
Système géodésique WGS84
0 10 20 30 40 50 Km

CRITERE FRAYERE
(basé sur l'abondance d'oeufs)

Echelle : 1 / 1 000 000
Projection de Mercator (48°N)
Système géodésique WGS84
0 10 20 30 40 50 Km

CRITERE BIODIVERSITE
(basé sur la richesse spécifique)

Echelle : 1 / 1 000 000 (48°N)
Projection de Mercator
Système géodésique WGS84
0 10 20 30 40 50 Km

Sensibilité à l'exploitation de matériaux marins

+
- très sensible
- sensible
- moyennement sensible
- peu sensible
- très peu sensible

-

Zone blanche = absence de données

© Ifremer - 2013

Saint-Brieuc, Brest, Côtes-d'Armor, Finistère, Quimper, Morbihan, Lorient, Loire-Atlantique, Saint-Nazaire, Noirmoutier, Vendée

Halieutique

Façade "Bretagne"

Ressources halieutiques

Echelle : 1 / 250 000 (48°N)
Projection de Mercator
Système géodésique WGS84



- 2013 -

Ifremer

Cette carte ne doit pas être utilisée pour la navigation

ATLANTIQUE

Finistère

Morbihan

Loire-Atlantique

Quimper

Lorient

Saint-Nazaire

Noirmoutier

3 milles

12 milles

100

LOCALISATION DES TRAITS DE CHALUTS DES CAMPAGNES SCIENTIFIQUES

Echelle : 1 / 1 000 000 (48°N)
Projection de Mercator
Système géodésique WGS84
0 10 20 30 40 50 Km

Critère COMMUNAUTE	EVHOE	(2005 à 2009)
	LANGOLF	(2006 à 2010)
	ORHAGO	(2007 à 2010)
Critère NOURRICERIE	Nurse	(2003 à 2005 ; 2008 ; 2009)
	LOGI	(2000 à 2003)
	PECOS	(2004 à 2006)
Critère FRAYERE	SOLDET	(1985 à 1989)

Critère DIVERSITE

CAMPAGNES HALIEUTIQUES

Unité : Nombre d'adultes / km²	Unité : Nombre de juvéniles / km²	Unité : Nombre d'oeufs / m²	Unité : Indice de Margalef
CRITERE COMMUNAUTE	CRITERE NOURRICERIE	CRITERE FRAYERE	CRITERE BIODIVERSITE

Moyenne des quartiles

SYNTHESE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

Indice de Fiabilite

Afin de tenir compte de l'ensemble des incertitudes, un indice de fiabilité a été établi, comportant 4 niveaux pour chaque critère ainsi que pour la synthèse des critères.

+
- 1: Fiabilité forte
- 2: Fiabilité moyenne
- 3: Fiabilité faible
- 4: Fiabilité très faible

-

Sensibilité des ressources halieutiques à l'exploitation de matériaux marins

(Synthèse des quatre critères)

+
- très sensible
- sensible
- moyennement sensible
- peu sensible
- très peu sensible

-

Zone blanche = absence de données

Cartes développées à partir d'une méthodologie d'analyse des données des campagnes halieutiques de l'Ifremer. Se référer au rapport "Observation des ressources halieutiques par les campagnes scientifiques françaises" pour obtenir des détails méthodologiques du développement de l'indice de sensibilité.

Bathymétrie

100 Isobathe (en m)

0 10 20 km

Sources des limites maritimes, du trait de côte et des départements : SHOM, DPMA, NOAA, IGN ; GEOFLAB

© Ifremer - 2013